

## **Туберкулинодиагностика – реакция Манту и Диаскинтест**

**Туберкулинодиагностика** – это диагностическое исследование, которое проводят в целях раннего выявления туберкулеза, а также с целью выявления лиц, имеющих риск развития туберкулеза.

**Проба Манту** – метод исследования, внутрикожная диагностическая проба с применением аллергена туберкулезного очищенного, которая проводится всем детям с 12-месячного возраста до 7 лет ежегодно. Туберкулин, используемый для постановки пробы Манту, не содержит живых микобактерий, поэтому заразиться туберкулезом после пробы невозможно.

**Диаскинтест** – препарат для диагностики туберкулеза (аллерген туберкулезный рекомбинантный). Диаскинтест проводится всем детям с 8 до 17 лет, ежегодно. Диаскинтест не может спровоцировать заражение туберкулезом, так как в своем составе не содержит возбудителей этого заболевания.

Преимуществами Диаскинтеста являются его избирательность, высокая чувствительность и возможность отслеживать эффективность лечения по увеличению или снижению активности микобактерий.

### ***Какими документами регламентируется проведение туберкулинодиагностики в России?***

– Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;

– Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 №109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», приложение №4 «Инструкция по применению туберкулиновых проб».

## **Важно знать!**

### **1. Проба Манту проводится 2 раза в год:**

- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также не привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки против туберкулеза;
- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом;
- детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию;
- ВИЧ-инфицированным детям.

**2. Не допускается проведение пробы Манту на дому,** а также во время карантина в детских организациях.

**3. Постановка пробы Манту проводится до профилактических прививок.** Прививки можно ставить сразу после прочтения результата пробы Манту. Если сначала была поставлена прививка, то интервал между профилактической прививкой и пробой Манту должен быть не менее одного месяца.

**4. Дети, направленные на консультацию** в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.

**5. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась,** допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Решение об отсутствии заболевания ребенка туберкулезом принимает врач-фтизиатр противотуберкулезного диспансера.

**6. Можно ли мочить пробу Манту?** Да, можно. Так как препарат вводится внутривенно, то вода не может попасть через кожу и повлиять на результат реакции.